

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

60 F.
ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 136 (5/79) - 9 MARS 1979

N'OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE REABONNEMENT SI VOUS NE L'AVEZ
PAS ENCORE FAIT, VOUS EVITEREZ UNE INTERRUPTION DANS LA RECEPTION DES
BULLETINS.

ARBORICULTURE

TAVELURE DU POIRIER

Assurez la protection fongicide au fur et à mesure que les variétés arrivent
au stade sensible C₃ D (bourgeons gonflés, apparition des boutons).

CLOQUE DU PECHER

Les alternances de périodes douces et pluvieuses sont favorables aux contamina-
tions, renouvelez la protection.

COLZA

CHARANCON DE LA TIGE

Les captures sont plus fréquentes depuis quelques jours ce qui indique que les
insectes sont en pleine activité. Depuis deux ou trois ans, on observait de faibles infes-
tations, à l'exception de la région d'Angoulême. Cette année encore, les observations en
culture ont montré la présence des charançons dans cette zone. On estime que les traitements
se justifient lorsque les captures en cuvettes jaunes dépassent 10 plusieurs jours consécu-
tifs.

CEREALES d'HIVER

LES TRAITEMENTS FONGICIDES :

Quelle va être l'incidence de l'hiver froid que nous venons de connaître, sur
les risques de dégâts dus aux maladies des céréales ?

1/ Actuellement, on voit de nombreuses cultures qui présentent un très mauvais état
végétatif, et on pourrait craindre que les blessures diverses causées par le gel, ne favori-
sent les attaques de septorioses et fusarioses. Plutôt que d'envisager des traitements, qui
seraient sans effets, il faut attendre les effets du réchauffement des températures sur la
reprise de végétation, sachant que les cultures bien poussantes, résisteront mieux aux para-
sites de faiblesse.

2/ Les maladies du pied sont en général peu graves lorsqu'on a des levées tardives
et un hiver froid. Cependant, en alternance avec des périodes très froides, on a vu cet
hiver quelques périodes douces et pluvieuses, très favorables aux contaminations par le
piétin-verse. En conséquence, la situation est encore incertaine, et nous conseillons d'at-
tendre le début du mois d'Avril pour décider de traitements éventuels. Nous fournirons
alors des renseignements plus précis.

3/ Les maladies du feuillage et des épis ont un développement étroitement lié aux conditions climatiques des mois d'Avril et Mai, et il est donc impossible actuellement de prédire leur importance. Les faibles densités observées actuellement, qui seront sans doute suivies d'un tallage insuffisant, laissent penser que la densité d'épis sera faible cette année, et les derniers facteurs du rendement (nombre de grains/épi et poids de 1.000 grains) auront donc une importance capitale. Sachant que ces facteurs sont facilement altérés par des attaques parasitaires du feuillage et des épis, une vigilance toute particulière sera nécessaire. Nos bulletins donneront toutes les indications utiles aux époques critiques.

Pour Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"

L'Ingénieur en Chef d'Agriculture, Adjoint :

J.Y. PEYRELONGUE

Imprimé à la Station le 9 Mars 1979
Précédente Note : Bulletin N° 135 du 23 Février 1979
N° papier de presse : 535 AD .